

## Cichorei middelenlijst 2023

De informatie in dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld door BO Akkerbouw in 2022 en door Sensus Agro bijgewerkt in 2023. Ondanks een uitvoerige controle kunnen wij geen enkele garantie geven over de juistheid, de volledigheid of het bijgewerkt zijn van de informatie. Lees voordat u een middel toepast altijd de informatie op het begeleidende etiket. Dit overzicht is een momentopname; er vinden regelmatig wijzigingen plaats.

Herbiciden	Middelen	Tijdstip	Plaag	Dosering	Frequentie, interval en max hoeveelheid	VHT in dagen	Opgebruik termijn
Benfluralin	<a href="#">Bonalan</a>	Voor inzaai	Eenjarige onkruiden	8 l/ha	1x max. 8 l/ha per teeltcyclus	-	12/05/2024
Clethodim	<a href="#">Centurion Plus</a>	Na opkomst	1-jarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1x max. 2,5 l/ha per teeltcyclus	56	-
	<a href="#">Wopro-Clethodim 120 gr/l</a>		Straatgras	1-2 l/ha			
	<a href="#">Wopro Clethodim 2</a>						
	<a href="#">Balistik</a>						
	<a href="#">CropGuard Clethodim 120 EC</a>						
	<a href="#">Inter Turion</a>	Kweek	2,5 l/ha				
Dimethenamide-P	<a href="#">Frontier Optima</a>	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	3x 0,3 l/ha 2x 0,45 l/ha 1x 0,9 L/ha	0,9 l/ha per teeltcyclus	?	-
Ethofumesaat	<a href="#">Tramat 200</a>	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	4-2x 0,25-0,5 l/ha	1 l/ha per teeltcyclus	-	-
	<a href="#">Ethofol 200 EC</a>			2-4x 0,1-0,2 L/ha	0,4 l/ha per teeltcyclus		
	<a href="#">Oblix 500 SC</a>						
Fluazifop-P-butyl	<a href="#">Fusilade Max</a>	Na opkomst	Grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1 x 1-2 l/ha*	56	-
	<a href="#">Tilia</a>						
Isoxaben	<a href="#">AZ 500</a>	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,04-0,2 l/ha	0,2 l/ha per teeltcyclus + max. 3 toepassingen per teeltcyclus	-	-

\* Dosering afhankelijk van onkruiddruk en groeistadium onkruiden

Herbiciden	Middelen	Tijdstip	Plaag	Dosering	Frequentie, interval en max hoeveelheid	VHT in dagen	Opgebruik termijn
Pendimethalin	<a href="#">Stomp 400 SC</a>	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	0,5 l/ha	2 l/ha verdeeld over 4 toepassingen	-	-
	<a href="#">Stomp SC</a>						
Propaquizafop	<a href="#">Agil 100 EC</a>	Tussen de rijen, zonder het gewas te raken	Eenjarige grasachtige onkruiden, raaigras, wilde haver, kweek	0,75l-1,5/ha	1,5 l/ha per 12 maanden	-	-
	<a href="#">Flash 100 EC</a>						
	<a href="#">Zetrola</a>						
Propyzamide	<a href="#">Kerb Flo</a>	Voor opkomst, na opkomst of na planten	Eenjarige onkruiden	3,75 l/ha	3,75 l/ha per teeltcyclus	-	-
	<a href="#">Setanta flo</a>						-
	<a href="#">CropGuard Propyzamide 400</a>						27-7-2024
Rimsulfuron	<a href="#">Titus</a>	Na opkomst	Onkruiden in tolerante rassen	30-40 g/ha	70 g/ha + max 2 toepassingen per teeltcyclus	-	-
	<a href="#">Wopro Rimsulfuron 250 WDG</a>						
S-metolachloor	<a href="#">Dual Gold 960 EC</a>	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	0,1-0,3 l/ha	1,3 l/ha + max 6 toepassingen per teeltcyclus	-	-
	<a href="#">Efica 960 EC</a>						
Triflusaaluron-methyl	<a href="#">Safari</a>	Na opkomst	Breedbladige onkruiden	30 g/ha	0,12 kg/ha + max 4 toepassingen per teeltcyclus	-	-
	<a href="#">Shiro</a>						
Glyfosaat	Veel middelen	Pleksgewijs en/of aanstrijken	Onkruiden	Zie etiket	Zie etiket	-	-

Insecticiden	Middelen	Tijdstip	Plaaq	Dosering	Maximale hoeveelheid en frequentie	VHT in dagen
Bacillus thuringiensis subsp. aizawai strain ABTS-1857	<a href="#">Xentari</a>	Gewasbehandeling	Rupsen van gamma-uil (Autographa gamma/Plusia spp.)	1 kg/ha	1 kg/ha + max. 8 toepassingen per 12 maanden	-
	<a href="#">Florbac</a>					
Bacillus thuringiensis subsp. aizawai strain GC-91	<a href="#">Turex Spuitpoeder</a>	Gewasbehandeling	Rupsen van gamma-uil (Autographa gamma/Plusia spp.)	1 kg/ha	3 kg/ha + max. 3 toepassingen per 12 maanden	-
	<a href="#">Turex WG</a>					
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351	<a href="#">DiPel DF</a>	Gewasbehandeling	Wintervlinder (Operophtera brumata), fruitmot (Cydia pomonella), spinselmot (Yponomeuta malinella), satijnvlinder (Leucoma salicis), voorjaarsuil (Orthosia cruda, Orthosia incerta)	0,5-1 kg/ha	8 kg/ha + max. 8 toepassingen per 12 maanden	-
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain SA-12	<a href="#">CoStar WG</a>	Gewasbehandeling	Gamma-uil (Autographa gamma), uilen (Plusia spp.)	0,3-1 kg/ha	6 l/ha + max. 6 toepassingen per 12 maanden	-
Cyantraniliprole	<a href="#">Benevia</a>	Gewasbehandeling	witlofmineervlieg (Napomyza cichorii)	0,75 l/ha	1,5 l/ha + max. 2 toepassingen per teeltcyclus	-
Deltamethrin	<a href="#">Decis Protech</a>	Gewasbehandeling	Wortelvlug (Psila rosae)	0,33 l/ha	0,66 l/ha + max. 2 toepassingen per 12 maanden	-
Knoflookextract	<a href="#">NEMguard DE</a>	Rijenbehandeling tijdens zaaien	Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.), wortellessieaaltjes (Pratylenchus penetrans)	20 kg/ha	20 kg/ha per teeltcyclus	-
Lambda-cyhalothrin	<a href="#">Karate Zeon</a>	Gewasbehandeling	Trips, bladluizen	0,05 l/ha	0,1 l/ha + max. 2 toepassingen per 12 maanden	7
	<a href="#">Ninja</a>					
Metarhizium anisoplae stam F52	<a href="#">Lalguard M52</a>	Grondbehandeling	Ritnaalden, emelten	12,5 kg/ha	Max. 2 toepassingen per 12 maanden	-
	<a href="#">Lalguard M52 OD</a>	Grondbehandeling	Ritnaalden, emelten	5,6 l/ha		4 uur

Insecticiden	Middelen	Tijdstip	Plaag	Dosering	Frequentie, interval en max hoeveelheid	VHT in dagen	Opgebruik termijn
Oxamyl	<a href="#">Vydate 10G</a>	Rijenbehandeling tijdens zaaien	Vrijlevende aaltjes	10 kg/ha	Max. 1 toepassing per teeltcyclus	-	31-10-2023
Spirotetramat	<a href="#">Movento</a>	Gewasbehandeling	Zevenbladluis (Cavariella aegopodii), bladluis (Aphis spp.), kleine peenluis (Semiaphis dauci), wollige peenluis (Pemphigus phenax), peenbladvlo (Triozia apicalis)	Bladluis 0,3l/ha Wortelluis /bladvlo 0,5l/ha	Max. 2 toepassingen per teeltcyclus	21	30-10-2025
	<a href="#">VSM Spirotetramat 100 SC</a>			Bladluis 0,45l/ha Wortelluis /bladvlo 0,75l/ha	0,45 l/ha – 0,75 l/ha + max. 4 toepassingen per 12 maanden		
	<a href="#">Batavia</a>						

Fungiciden	Middelen	Tijdstip	Plaag	Dosering	Maximale hoeveelheid en frequentie	VHT in dagen	Opgebruik termijn
Azoxystrobin + difenoconazool	<a href="#">Amistar Top</a>	Gewasbehandeling	Bladvlekkenziekte ( <i>Alternaria cichorii</i> ), roest ( <i>Puccinia cichorii</i> ). echte meeldauw ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	1 l/ha	Max. 2 toepassingen per 12 maanden	30	-
Bacillus amyloliquefaciens stam FZb 24	<a href="#">Taegro</a>	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> ), loofverbruining ( <i>Alternaria dauci</i> )	0,37 kg/ha	Max. 12 toepassingen per teeltcyclus	4 uur	-
Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747	<a href="#">Amylo-X WG</a>	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ( <i>Erysiphaceae</i> ), rattenkeutelziekte ( <i>Sclerotinia</i> spp.), loofverbruining ( <i>Alternaria</i> spp.)	2,5kg/ha	Max. 6 toepassingen per 12 maanden	1	-
Bacillus amyloliquefaciens (voorheen subtilis) stam QST 713	<a href="#">Serenade</a>	Gewasbehandeling	Grauwe Schimmel ( <i>Botrytis cinerea</i> ), <i>Sclerotinia</i> ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), Echte meeldauw ( <i>Erysiphaceae</i> ), <i>Alternaria</i> ( <i>Alternaria</i> spp.), Roest ( <i>Phragmidium mucronatum</i> )	5-8 l/ha	Max. 8 l/ha + max. 6 toepassingen per 12 maanden	-	-
		Grondbehandeling	<i>Rhizoctonia</i> ( <i>Rhizoctonia</i> spp.), <i>Pythium</i> ( <i>Pythium mastophorum</i> ), Wortelrot ( <i>Helicobasidium brebissonii</i> ), <i>Fusarium</i> ( <i>Fusarium oxysporum</i> )	10 l/ha	Max. 10 l/ha + max. 1 toepassingen per 12 maanden		
Bacillus pumilus QST 2808	<a href="#">Sonata</a>	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ( <i>Erysiphe</i> spp.)	5-10 l/ha	Max. 6 toepassingen per 12 maanden	1	28-2-2025
Boscalid+pyraclostrobin	<a href="#">Signum</a>	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	1,5 kg/ha	Max. 2 toepassingen per 12 maanden	14	-
<i>Coniothyrium minitans</i> stam CON/M/91-8	<a href="#">Contans</a>	Grondbehandeling, voor of tijdens zaaien, planten of poten	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> en <i>Sclerotinia minor</i>	2 kg/ha	Max. 1 toepassingen per 12 maanden	-	-
Kalium waterstofcarbonaat	<a href="#">Karma</a>	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	3 kg/ha	24 kg/ha + max. 8 toepassingen per 12 maanden	1	-
	<a href="#">Kumar</a>						

Fungiciden	Middelen	Tijdstip	Plaa	Dosering	Maximale hoeveelheid en frequentie	VHT in dagen
Trichoderma atroviride strain I-1237	<a href="#">Tri-Soil</a>	Grondbehandeling voor het planten	Rhizoctonia spp.	5 kg/ha	3 kg/ha + max 1 toepassing per teeltcyclus	-
Trifloxystrobin	<a href="#">Flint</a>	Gewasbehandeling	Echte meeldauw (Erysiphe chioracearum/ Golovinomyces cichoracearum)	0,25 kg/ha	0,25 kg/ha + max 2 toepassing per 12 maanden	21

Diversen	Middelen	Tijdstip	Plaa	Dosering	Maximale hoeveelheid en frequentie	VHT in dagen
Bier	<a href="#">Basisstof</a>	Vanaf begin aantasting	Slakken	1 val/m2	1-5 keer per teeltcyclus	-
Ijzer(III)fosfaat	<a href="#">Derrex</a>	Strooien	Naaktslakken (Ironmax Pro ook huisjesslakken)	7 kg/ha	Max. 4 toepassingen per 12 maanden	-
	<a href="#">NEU 1181M</a>					
	<a href="#">Sluxx HP</a>					
	<a href="#">Iroxx</a>					
	<a href="#">Ironmax Pro</a>					
	<a href="#">Molluxx</a>					
	<a href="#">Natria Slakkenkorrels</a>			25-50 kg/ha	Max. 4 toepassingen per 12 maanden	
	<a href="#">Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels</a>					
	<a href="#">Solabiol Slakkenkorrels</a>					
<a href="#">Ferrex</a>	6 kg/ha	Max. 5 toepassingen per 12 maanden				