



J. (Hans) de Keijzer, Coördinator Effectief Middelenpakket Akkerbouw

De informatie in dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks een uitvoerige controle kunnen wij geen enkele garantie geven over de juistheid, de volledigheid of het bijgewerkt zijn van de informatie. Lees voordat u een middel toepast altijd de informatie op het begeleidende etiket.

Dit overzicht is een momentopname; er vinden regelmatig wijzigingen plaats. Voor de laatste stand van zaken moet u opnieuw een verzoek indienen.

| Herbiciden | Middelen | Plaaq | Tijdstip | Dosering, frequentie, interval en vht |
|-------------------|--|---|--|---|
| Benfluralin | Bonalan | Eenjarige onkruiden | Voor inzaai | 8 l/ha; 1x |
| Carbetamide | Legurame vloeibaar (vervallen; opgebruik tot 3-10-19) | Eenjarige onkruiden | Voor en na opkomst | 7 l/ha i.c.m. 1,5 l/ha chloorprofam; 2x; 14d |
| Chloorprofam | Certis Chloor IPC, Intruder, Isopan, Aliacine | Eenjarige onkruiden | Voor en na opkomst | Certis: 2 l/ha; 3x; 5d; of 0,5-1,0 l/ha; 12x; 5d; max. 4-6 l/ha; Intruder voor opk. 2 l/ha; 2x; 7d; na opk. 0,5-1 l/ha; 8x; 5d; max. 4 l/ha; rest voor opk. 2 l/ha; 2x; 7d; na opk. 0,5-1 l/ha; 6x; 5d; max. 4 l/ha |
| Clethodim | Centurion Plus, Wopro-Clethodim 120 gr/l, Balistik, CropGuard Clethodim 120 EC | Eenjarige grasachtige onkruiden, kweek | Na opkomst | 1 l/ha; 1x; tegen kweek 2,5 l/ha; 1x; vht 56d |
| Dimethenamide-P | Frontier Optima | Eenjarige onkruiden | Na opkomst | 0,3 l/ha; 3x; 7d of 0,45 l/ha; 2x; 7d of 0,9 l/ha; 1x |
| Ethofumesaat | Tramat 200, Oblix 200 EC, Oblix 500 SC | Eenjarige onkruiden | Na opkomst | 0,25-0,5 l/ha; 4x; 7d; max. 1 l/ha; Oblix 500 SC 0,1-0,2 l/ha; 4x; 7d; max. 0,4 l/ha |
| Fluazifop-P-butyl | Fusilade Max | Grasachtige onkruiden | Na opkomst | 1-3 l/ha; 1x; vht 56d; niet tussen 30-9 en 1-4 |
| Isoxaben | AZ 500 | Eenjarige breedbladige onkruiden | Na opkomst | 0,04-0,2 l/ha; 3x; 6d; max. 0,2 l/ha; niet in grondwaterbeschermingsgebieden |
| Pendimethalin | Stomp 400 SC, Stomp SC | Eenjarige onkruiden | Na opkomst | 0,5 l/ha; 4x; 7d (op percelen grenzend aan oppervlaktewater max. 1x per seizoen) |
| Propaquizafop | Agil 100 EC, Flash 100 EC, Zetrola | Eenjarige grasachtige onkruiden, raaigras, wilde haver, kweek | Tussen de rijen, zonder het gewas te raken | Eenjarige grasachtige onkruiden 0,75-1 l/ha; 1x; raaigras, wilde haver 1-1,2 l/ha; 1x; kweek 0,75 l/ha; 2x; 14d of 1,5 l/ha; 1x; max. 1,5 l/ha; vht |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | | 30d |
| Propyzamide | Kerb Flo, Kerb 50 W spuitpoeder (vervallen; aflevering tot 1-7-19; opgebruik tot 1-7-20), Setanta flo, Careca, Relva, CropGuard Propyzamide 400 | Eenjarige onkruiden (Relva ook kweek) | Voor opkomst, na opkomst of na planten (Careca alleen voor opkomst; Relva voor of na opkomst) | 3,75 l/ha; 1x; of 0,25-2,5 l/ha; 5x; 5d; max. 3,75 l/ha; Kerb 50 W 3 kg/ha; 1x; Careca 3 l/ha; 1x; vht 42d; Relva 2,8-3,1 l/ha; 1x |
| Rimsulfuron | Titus, Wopro Rimsulfuron 250 WDG | Onkruiden in tolerante rassen | Na opkomst | 30-40 g/ha; 2x; 10d; max. 70 g/ha |
| S-metolachloor | Dual Gold 960 EC, Efica 960 EC | Eenjarige onkruiden | Na opkomst | 0,1-0,3 l/ha; 6x; 5d; max. 1,3 l/ha; niet in grondwaterbeschermingsgebieden; niet op zandgrond |
| Triflursulfuron-methyl | Safari | Breedbladige onkruiden | Na opkomst | 30 g/ha; 4x; 7d |
| Diquat dibromide (vervallen; afleveren tot 4-11-19; opgebruik tot 4-4-20) | Dragoon, Mission 200 SL, Reglone Bold | Eenjarige breedbladige onkruiden, vogelmuur (Stellaria media) | Voor opkomst of voor uitplanten | 1,5 l/ha; 1x |
| Glyfosaat | Veel middelen | Onkruiden | Pleksgewijs en/of aanstrijken | Zie etiketten |
| Insecticiden | Middelen | Plaa | Tijdstip | Dosering, frequentie, interval en vht |
| Bacillus thuringiensis sups. Aizawai | Turex Spuitpoeder, Turex WG, XenTari | Rupsen van gamma-uil (Autographa gamma/Plusia spp.) | Gewasbehandeling | 1 kg/ha; 8x; 6d; Turex 1 kg/ha; 3x; 7d |
| Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki | DiPel DF | Wintervlinder (Operophtera brumata), fruitmot (Cydia pomonella), spinselmot (Yponomeuta malinella), satijnvlinder (Leucoma salicis), voorjaarsuil (Orthosia cruda, Orthosia incerta) | Gewasbehandeling | 0,5-1 kg/ha; 8x; 7d |
| Cyantraniliprole | Benevia | witlofmineervlieg (Napomyza cichorii) | Gewasbehandeling | 0,75 l/ha; 2x; 7d; vht 14d; niet in grondwaterbeschermingsgebieden |
| Knoflookextract | NEMguard DE | Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.), wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) | Rijenbehandeling tijdens zaaien | 20 kg/ha; 1x |
| Lambda-cyhalothrin | Karate, Ninja | Trips, bladluizen | Gewasbehandeling | 0,1 l/h; 2x; 10d; vht 7d |
| Metarhizium anisoplae stam F52 | BIO 1020, Met52 OD | Ritnaalden, emelten | Grondbehandeling | BIO 1020 12,5 kg/ha; 2x; 7d; Met52 OD 5.6 l/ha; 2x; 7d; vht 4 uur |
| Oxamyl | Vydate 10G, Wopro Oxamyl 10% G | Vrijlevende aaltjes | Rijenbehandeling tijdens zaaien | 10 kg/ha; 1x |
| Spirotetramat | Movento, VSM Spirotetramat 100 SC | Zevenbladluis (Cavariella aegopodii), bladluis (Aphis spp.), kleine peenluis (Semiaphis dauci), | Gewasbehandeling | 0,3 l/ha; 2x; 14d; vht 21d; wortelluis en bladvlo 0,5 l/ha; 2x; max. 1 l/ha |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | | wollige peenluis (Pemphigus phenax), peenbladvlo (Trioza apicalis) | | |
| Thiacloprid | Calypso | Bladluizen (groene en rode perzikluis [Myzus persicae], aardappeltopluis [Macrosiphum euphorbiae], wegedoornluis [Aphis nasturtii], vuilboomluis [Aphis frangulae], zwarte bonenluis [Aphis fabae], sjalotteluis [Myzus ascalonicus], katoenluis [Aphis gossypii]) | Gewasbehandeling | 0,25 l/ha; 2x; 7d; vht 7d |
| Fungiciden | Middelen | Plaa | Tijdstip | Dosering, frequentie, interval, vht e.d. |
| Bacillus amyloliquefaciens (voorheen subtilis) stam QST 713 | Serenade | Sclerotinia sclerotiorum, meeldauw (Erysiphales), Alternaria spp. | Gewasbehandeling | 8 l/ha; 6x; 5d |
| Boscalid+pyraclostrobin | Signum | Echte meeldauw (Erysiphe cichoracearum) | Gewasbehandeling | 1,5 kg/ha; 2x; 14d; vht 14d |
| Coniothyrium minitans stam CON/M/91-8 | Contans | Sclerotinia sclerotiorum en Sclerotinia minor | Grondbehandeling, voor of tijdens zaaien, planten of poten | 2 kg/ha; 5 cm inwerken |
| Kalium waterstofcarbonaat | Karma | Echte meeldauw (Erysiphe cichoracearum) | Gewasbehandeling | 3 kg/ha; 8x; 7d; vht 1d |
| Trifloxystrobin | Flint | Echte meeldauw (Erysiphe cichoracearum/ Golovinomyces cichoracearum) | Gewasbehandeling | 0,25 kg/ha; 2x; 21d; vht 21d |
| Diversen | Middelen | Plaa | Tijdstip | Dosering, frequentie, interval, vht e.d. |
| Ijzer(III)fosfaat | Derrex, NEU 1181M, Sluux HP, Natria Slakkenkorrels, Iroxx, CropGuard Slakkenkorrel, Ironmax Pro, Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels, Daxxos, Solabiol Slakkenkorrels, Ferrex | Naaktslakken | Strooien | 7 kg/ha; 4x; 7d (Ironmax Pro 5d) Natria, Ferramol en Solabiol 25-50 kg/ha; 4x; 14d |