

## Cichorei per 6 mei 2020



J. (Hans) de Keijzer, Coördinator Effectief Middelenpakket Akkerbouw

De informatie in dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks een uitvoerige controle kunnen wij geen enkele garantie geven over de juistheid, de volledigheid of het bijgewerkt zijn van de informatie. Lees voordat u een middel toepast altijd de informatie op het begeleidende etiket.

Dit overzicht is een momentopname; er vinden regelmatig wijzigingen plaats. Voor de laatste stand van zaken moet u opnieuw een verzoek indienen.

Herbiciden	Middelen	Plaaig	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval en vht
Benfluralin	Bonalan	Eenjarige onkruiden	Voor inzaai	8 l/ha; 1x
Chloorprofam ( <b>vervallen; aflevering tot 8-7-20; opgebruik tot 8-10-20</b> )	Certis Chloor IPC, Intruder, Isopan, Aliacine	Eenjarige onkruiden	Voor en na opkomst	Certis: 2 l/ha; 3x; 5d; of 0,5-1,0 l/ha; 12x; 5d; max. 4-6 l/ha; Intruder voor opk. 2 l/ha; 2x; 7d; na opk. 0,5-1 l/ha; 8x; 5d; max. 4 l/ha; rest voor opk. 2 l/ha; 2x; 7d; na opk. 0,5-1 l/ha; 6x; 5d; max. 4 l/ha
Clethodim	Centurion Plus, Wopro-Clethodim 120 gr/l, Balistik, CropGuard Clethodim 120 EC	Eenjarige grasachtige onkruiden, kweek, straatgras	Na opkomst	1 l/ha; 1x; tegen kweek 2,5 l/ha; 1x; straatgras 1-2 l/ha; 1x; vht 56d; max. 2,5 l/ha
Dimethenamide-P	Frontier Optima	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,3 l/ha; 3x; 7d of 0,45 l/ha; 2x; 7d of 0,9 l/ha; 1x
Ethofumesaat	Tramat 200, Oblix 200 EC, Oblix 500 SC	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,25-0,5 l/ha; 4x; 7d; max. 1 l/ha; Oblix 500 SC 0,1-0,2 l/ha; 4x; 7d; max. 0,4 l/ha
Fluazifop-P-butyl	Fusilade Max	Grasachtige onkruiden	Na opkomst	1-3 l/ha; 1x; vht 56d; niet tussen 30-9 en 1-4
Isoxaben	AZ 500	Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	0,04-0,2 l/ha; 3x; 6d; max. 0,2 l/ha; niet in grondwaterbeschermingsgebieden
Pendimethalin	Stomp 400 SC, Stomp SC	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,5 l/ha; 4x; 7d (op percelen grenzend aan oppervlaktewater max. 1x per seizoen)
Propaquizafop	Agil 100 EC, Flash 100 EC, Zetrola	Eenjarige grasachtige onkruiden, raaigras, wilde haver, kweek	Tussen de rijen, zonder het gewas te raken	Eenjarige grasachtige onkruiden 0,75-1 l/ha; 1x; raaigras, wilde haver 1-1,2 l/ha; 1x; kweek 0,75 l/ha; 2x; 14d of 1,5 l/ha; 1x; max. 1,5 l/ha; vht 30d
Propyzamide	Kerb Flo, Kerb 50 W	Eenjarige onkruiden (Relva ook	Voor opkomst, na opkomst of	3,75 l/ha; 1x; of 0,25-2,5 l/ha; 5x;

	spruitpoeder ( <b>vervallen; opgebruik tot 1-7-20</b> ), Setanta flo, Relva ( <b>vervallen; opgebruik tot 31-12-20</b> ), CropGuard Propyzamide 400	kweek)	na planten (Relva voor of na opkomst)	5d; max. 3,75 l/ha; Kerb 50 W 3 kg/ha; 1x; Relva 2,8-3,1 l/ha; 1x
Rimsulfuron	Titus, Wopro Rimsulfuron 250 WDG	Onkruiden in tolerante rassen	Na opkomst	30-40 g/ha; 2x; 10d; max. 70 g/ha
S-metolachloor	Dual Gold 960 EC, Efica 960 EC	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,1-0,3 l/ha; 6x; 5d; max. 1,3 l/ha; niet in grondwaterbeschermingsgebieden; niet op zandgrond
Triflusaluron-methyl	Safari, Shiro	Breedbladige onkruiden	Na opkomst	30 g/ha; 4x; 7d; Shiro ook 20 g/ha; 6x; 5d
Glyfosaat	Veel middelen	Onkruiden	Pleksgewijs en/of aanstrijken	Zie etiketten
<b>Insecticiden</b>	<b>Middelen</b>	<b>Plaag</b>	<b>Tijdstip</b>	<b>Dosering, frequentie, interval en vht</b>
Bacillus thuringiensis subs. Aizawai	Turex Spuitpoeder, Turex WG, XenTari, Florbac	Rupsen van gamma-uil (Autographa gamma/Plusia spp.)	Gewasbehandeling	1 kg/ha; 8x; 6d; Turex 1 kg/ha; 3x; 7d
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	DiPel DF	Wintervlinder (Operophtera brumata), fruitmot (Cydia pomonella), spinselmot (Yponomeuta malinella), satijnvlinder (Leucoma salicis), voorjaarsuil (Orthosia cruda, Orthosia incerta)	Gewasbehandeling	0,5-1 kg/ha; 8x; 7d
Cyantraniliprole	Benevia	witlofmineervlieg (Napomyza cichorii)	Gewasbehandeling	0,75 l/ha; 2x; 7d; vht 14d; niet in grondwaterbeschermingsgebieden
Knoflookextract	NEMguard DE	Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.), wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans)	Rijenbehandeling tijdens zaaien	20 kg/ha; 1x
Lambda-cyhalothrin	Karate, Ninja	Trips, bladluizen	Gewasbehandeling	0,05 l/h; 2x; 10d; vht 7d
Metarhizium anisoplae stam F52	BIO 1020, Met52 OD	Ritnaalden, emelten	Grondbehandeling	BIO 1020 12,5 kg/ha; 2x; 7d; Met52 OD 5.6 l/ha; 2x; 7d; vht 4 uur
Oxamyl	Vydate 10G, Wopro Oxamyl 10% G	Vrijlevende aaltjes	Rijenbehandeling tijdens zaaien	10 kg/ha; 1x
Spirotetramat	Movento, VSM Spirotetramat 100 SC, Batavia	Zevenbladluis (Cavariella aegopodii), bladluis (Aphis spp.), kleine peenluis (Semiaphis dauci), wollige peenluis (Pemphigus phenax), peenbladvlo (Triozza apicalis)	Gewasbehandeling	0,3 l/ha; 2x; 14d; Batavia 0,45 l/ha; vht 21d; wortelluis en bladvlo 0,5 l/ha; Batavia 0,75 l/ha; 2x; max. 1 l/ha; Batavia 4x
Thiacloprid ( <b>vervalt per 3-8-20; aflevering en</b>	Calypso	Bladluizen (groene en rode perzikluis [Myzus persicae],	Gewasbehandeling	0,25 l/ha; 2x; 7d; vht 7d

<b>opgebruik tot 3-2-21)</b>		aardappeltopluis [Macrosiphum euphorbiae], wegedoornluis [Aphis nasturtii], vuilboomluis [Aphis frangulae], zwarte bonenluis [Aphis fabae], sjalotteluis [Myzus ascalonicus], katoenluis [Aphis gossypii])		
<b>Fungiciden</b>	<b>Middelen</b>	<b>Plaa</b>	<b>Tijdstip</b>	<b>Dosering, frequentie, interval, vht e.d.</b>
Azoxystrobin + difenoconazool	Amistar Top	Bladvlekkenziekte (Alternaria cichorii), roest (Puccinia cichorii). echte meeldauw (Erysiphe cichoracearum)	Gewasbehandeling	1,0 l/ha; 2x; 21d, vht 30d; niet in grondwaterbeschermingsgebieden
Bacillus amyloliquefaciens (voorheen subtilis) stam QST 713	Serenade	Sclerotinia sclerotiorum, echte meeldauw (Erysiphaceae), Alternaria spp., Rhizoctonia (Rhizoctonia spp.)	Gewasbehandeling, grondbehandeling	Gewasbehandeling 8 l/ha; 6x; 5d; grondbehandeling 10 l/ha; 1x
Bacillus pumilus QST 2808	Sonata	Echte meeldauw (Erysiphe spp.)	Gewasbehandeling	5-10 l/ha; 6x; 5d; vht 1d
Boscalid+pyraclostrobin	Signum	Echte meeldauw (Erysiphe cichoracearum)	Gewasbehandeling	1,5 kg/ha; 2x; 14d; vht 14d
Coniothyrium minitans stam CON/M/91-8	Contans	Sclerotinia sclerotiorum en Sclerotinia minor	Grondbehandeling, voor of tijdens zaaien, planten of poten	2 kg/ha; 5 cm inwerken
Kalium waterstofcarbonaat	Karma	Echte meeldauw (Erysiphe cichoracearum)	Gewasbehandeling	3 kg/ha; 8x; 7d; vht 1d
Trifloxystrobin	Flint	Echte meeldauw (Erysiphe cichoracearum/ Golovinomyces cichoracearum)	Gewasbehandeling	0,25 kg/ha; 2x; 21d; vht 21d
<b>Diversen</b>	<b>Middelen</b>	<b>Plaa</b>	<b>Tijdstip</b>	<b>Dosering, frequentie, interval, vht e.d.</b>
Ijzer(III)fosfaat	Derrex, NEU 1181M, Sluux HP, Natria Slakkenkorrels, Iroxx, CropGuard Slakkenkorrel ( <b>vervallen; aflevering tot 10-7-20; opgebruik tot 10-7-21</b> ), Ironmax Pro, Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels, Mollux, Solabiol Slakkenkorrels, Ferrex	Naaktslakken	Strooien	7 kg/ha; 4x; 7d (Ironmax Pro 5d) Natria, Ferramol en Solabiol 25-50 kg/ha; 4x; 14d