

J. (Hans) de Keijzer, Coördinator Effectief Middelenpakket Akkerbouw

De informatie in dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks een uitvoerige controle kunnen wij geen enkele garantie geven over de juistheid, de volledigheid of het bijgewerkt zijn van de informatie. Lees voordat u een middel toepast altijd de informatie op het begeleidende etiket. Dit overzicht is een momentopname; er vinden regelmatig wijzigingen plaats.

Herbiciden	Middelen	Plaa	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval en vht
Benfluralin	Bonalan	Eenjarige onkruiden	Voor inzaai	8 l/ha; 1x
Clethodim	Centurion Plus, Wopro-Clethodim 120 gr/l, Balistik, CropGuard Clethodim 120 EC, Inter Turion	Eenjarige grasachtige onkruiden, kweek, straatgras	Na opkomst	1 l/ha; 1x; tegen kweek 2,5 l/ha; 1x; straatgras 1-2 l/ha; 1x; vht 56d; max. 2,5 l/ha
Dimethenamide-P	Frontier Optima	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,3 l/ha; 3x; 7d of 0,45 l/ha; 2x; 7d of 0,9 l/ha; 1x
Ethofumesaat	Tramat 200, Ethofol 200 EC, Oblix 500 SC	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,25-0,5 l/ha; 4x; 7d; max. 1 l/ha; Oblix 500 SC 0,1-0,2 l/ha; 4x; 7d; max. 0,4 l/ha
Fluazifop-P-butyl	Fusilade Max, Tilia	Grasachtige onkruiden	Na opkomst	1-3 l/ha; 1x; vht 56d; niet tussen 30-9 en 1-4
Isoxaben	AZ 500	Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	0,04-0,2 l/ha; 3x; 6d; max.0,2 l/ha; niet in grondwaterbeschermingsgebieden
Pendimethalin	Stomp 400 SC, Stomp SC	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,5 l/ha; 4x; 7d (op percelen grenzend aan oppervlaktewater max. 1x per seizoen)
Propaquizafop	Agil 100 EC, Flash 100 EC, Zetrola	Eenjarige grasachtige onkruiden, raaigras, wilde haver, kweek	Tussen de rijen, zonder het gewas te raken	Eenjarige grasachtige onkruiden 0,75-1 l/ha; 1x; raaigras, wilde haver 1-1,2 l/ha; 1x; kweek 0,75 l/ha; 2x; 14d of 1,5 l/ha; 1x; max. 1,5 l/ha; vht 30d
Propyzamide	Kerb Flo, Setanta flo, CropGuard Propyzamide 400	Eenjarige onkruiden	Voor opkomst, na opkomst of na planten	3,75 l/ha; 1x; of 0,25-2,5 l/ha; 5x; 5d; max. 3,75 l/ha
Rimsulfuron	Titus, Wopro Rimsulfuron 250 WDG	Onkruiden in tolerante rassen	Na opkomst	30-40 g/ha; 2x; 10d; max. 70 g/ha

Herbiciden	Middelen	Plaag	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval en vht
S-metolachloor	Dual Gold 960 EC, Efica 960 EC	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,1-0,3 l/ha; 6x; 5d; max. 1,3 l/ha; niet in grondwaterbeschermingsgebieden; niet op zandgrond
Triflusaluron-methyl	Safari, Shiro	Breedbladige onkruiden	Na opkomst	30 g/ha; 4x; 7d; Shiro ook 20 g/ha; 6x; 5d
Glyfosaat	Veel middelen	Onkruiden	Plekgewijs en/of aanstrijken	Zie etiketten

Insecticiden	Middelen	Plaaig	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval en vht
Bacillus thuringiensis subsp. aizawai strain ABTS-1857	XenTari, Florbac	Rupsen van gamma-uil (Autographa gamma/Plusia spp.)	Gewasbehandeling	1 kg/ha; 8x; 6d
Bacillus thuringiensis subsp. aizawai strain GC-91	Turex Spuitpoeder, Turex WG	Rupsen van gamma-uil (Autographa gamma/Plusia spp.)	Gewasbehandeling	1 kg/ha; 3x; 7d
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351	DiPel DF	Wintervlinder (Operophtera brumata), fruitmot (Cydia pomonella), spinselmot (Yponomeuta malinella), satijnvlinder (Leucoma salicis), voorjaarsuil (Orthosia cruda, Orthosia incerta)	Gewasbehandeling	0,5-1 kg/ha; 8x; 7d
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain SA-12	CoStar WG	Gamma-uil (Autographa gamma), uilen (Plusia spp.)	Gewasbehandeling	0,3-1 kg/ha; 6x; 7d
Cyantraniliprole	Benevia	Witlofmineervlieg (Napomyza cichorii)	Gewasbehandeling	0,75 l/ha; 2x; 7d; vht 14d; niet in grondwaterbeschermingsgebieden
Deltamethrin	Decis Protech	Wortelvlies (Psila rosae)	Gewasbehandeling	0,5 l/ha; 2x; 14d; vht 7d
Knoflookextract	NEMguard DE	Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.), wortellessieaaltjes (Pratylenchus penetrans)	Rijenbehandeling tijdens zaaien	20 kg/ha; 1x
Lambda-cyhalothrin	Karate, Ninja	Trips, bladluizen	Gewasbehandeling	0,05 l/ha; 2x; 10d; vht 7d
Metarhizium anisoplae stam F52	BIO 1020, Met52 OD	Ritnaalden, emelten	Grondbehandeling	BIO 1020 12,5 kg/ha; 2x; 7d; Met52 OD 5.6 l/ha; 2x; 7d; vht 4 uur
Oxamyl	Vydate 10G, Wopro Oxamyl 10% G	Vrijlevende aaltjes	Rijenbehandeling tijdens zaaien	10 kg/ha; 1x
Spirotetramat	Movento, VSM Spirotetramat 100 SC, Batavia	Zevenbladluis (Cavariella aegopodii), bladluis (Aphis spp.), kleine peenluis (Semiaphis dauci), wollige peenluis (Pemphigus phenax), peenbladvlo (Trioza apicalis)	Gewasbehandeling	0,3 l/ha; 2x; 14d; Batavia 0,45 l/ha; vht 21d; wortelluis en bladvlo 0,5 l/ha; 2x; Batavia 0,75 l/ha; 4x

Fungiciden	Middelen	Plaag	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval, vht e.d.
Azoxystrobin + difenoconazool	Amistar Top	Bladvlekkenziekte (<i>Alternaria cichorii</i>), roest (<i>Puccinia cichorii</i>). echte meeldauw (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	Gewasbehandeling	1,0 l/ha; 2x; 21d, vht 30d; niet in grondwaterbeschermingsgebieden
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> stam FZb 24	Taegro	Echte meeldauw (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), loofverbruining (<i>Alternaria dauci</i>)	Gewasbehandeling	0,37 kg/ha; 12x; 3d; vht 4 uur
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (voorheen <i>subtilis</i>) stam QST 713	Serenade	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , echte meeldauw (<i>Erysiphaceae</i>), <i>Alternaria</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> (<i>Rhizoctonia</i> spp.)	Gewasbehandeling, grondbehandeling	Gewasbehandeling 8 l/ha; 6x; 5d; grondbehandeling 10 l/ha; 1x
<i>Bacillus pumilus</i> QST 2808	Sonata	Echte meeldauw (<i>Erysiphe</i> spp.)	Gewasbehandeling	5-10 l/ha; 6x; 5d; vht 1d
Boscalid+pyraclostrobin	Signum	Echte meeldauw (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	Gewasbehandeling	1,5 kg/ha; 2x; 14d; vht 14d
<i>Coniothyrium minitans</i> stam CON/M/91-8	Contans	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> en <i>Sclerotinia minor</i>	Grondbehandeling, voor of tijdens zaaien, planten of poten	2 kg/ha; 5 cm inwerken
Kalium waterstofcarbonaat	Karma, Kumar	Echte meeldauw (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	Gewasbehandeling	3 kg/ha; 8x; 7d; vht 1d
<i>Trichoderma atroviride</i> strain I-1237	Tri-Soil	<i>Rhizoctonia</i>	Grondbehandeling voor het planten	5 kg/ha; 1x
Trifloxystrobin	Flint	Echte meeldauw (<i>Erysiphe cichoracearum</i> / <i>Golovinomyces cichoracearum</i>)	Gewasbehandeling	0,25 kg/ha; 2x; 21d; vht 21d

Diversen	Middelen	Plaag	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval, vht e.d.
Bier	basisstof	Slakken	Vanaf begin aantasting	1 val/m ² ; 1-5x
Ijzer(III)fosfaat	Derrex, NEU 1181M, Sluxx HP, Natria Slakkenkorrels, Iroxx, Ironmax Pro, Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels, Mollux, Solabiol Slakkenkorrels, Ferrex	Naaktslakken (Ironmax Pro ook huisjesslakken)	Strooien	7 kg/ha; 4x; 7d (Ironmax Pro 5d) Natria, Ferramol en Solabiol 25-50 kg/ha; 4x; 14d